

QUADRO DAS AFECÇÕES MAIS COMUNS E TERAPÊUTICAS MAIS ACONSELHADAS - AVIZOON

	SINTOMAS	DIAGNÓSTICO PROVÁVEL	CAUSAS PROVÁVEIS	TERAPÊUTICA (*)	OBSERVAÇÕES
DO APARELHO DIGESTIVO	Lesões ao nível da pele (comissuras no bico, à volta dos olhos), narinas e garganta. Na forma benigna crostas purulentas.	Variola. Mortalidade elevada (ver abaixo "Micoses")	Vírus contagioso. Mosquitos ou aves recém-vacinadas podem ser portadoras	ENTEROPLUS (nem sempre eficaz na forma aguda) ZOOSPRAY contra mosquitos	Muito contagiosa. O vírus pode permanecer 1 ano nos locais. Desinfectar bem as instalações com VIRUDINE ou VIRKON S. Vacinar.
	Fígado inchado e escuro; fezes acastanhadas e diarreias. Ave "embolada" e com dificuldade respiratória parecendo cansada.	Hepatite ou afecção hepática por excesso de gordura nas sementes. Mortalidade a longo prazo.	Alimentação excessivamente rica em sementes gordas (nabo, colza, semilha, canhamo, girassol)	Dieta só de alpista, aveia e milho alvo. Nos psitacídeos, demolhar as sementes. Dar COLINA Ca(P 2 a 3 vezes por semana permanentemente e VITA B COMPLEXO 1 ou 2 vezes. Administrar PROTEXIN.	Muito comum nos canários e psitacídeos. Confunde-se por vezes com problemas respiratórios. Diminuir a percentagem de sementes oleaginosas.
	Falta de apetite. Ave semi embolada não chega a digerir as sementes. Muita sede. Diarreia. Emagrecimento. O animal não tratado morre, passando os últimos momentos tentando alimentar-se	Gastroenterite sub-aguda ou aguda. Síndrome "Doença da Faca"	Mudanças bruscas na alimentação. Agressões por colibacilos ou salmonelas.	PLURISTRESS, ENTEROPLUS, ZOOZERINE + VITA B COMPLEXO	Isolar, Local aquecido (poderá ser contagioso). Fornecer sementes germinadas. PROTEXIN após tratamento.
	Diarreia, ave "embolada", Ninhos húmidos, Fêmeas 'suadas'. Grande consumo de água (forma crónica). Nos primeiros dias (3º ao 9º) as crias apresentam emagrecimento, palidez na pele e nas mucosas (interior do bico e boca). Pescoço muito delgado. Enterite aguda. Morte em 48 horas. As aves apresentam a cloaca obstruída com fezes.	Colibacelose (causa principal da morte nas crias)	"Escheria Coli" nas águas contaminadas; verdura conspurcada. Transmissão directa de pais para filhos.	Cura difícil. Prevenção com PROMOCRIA EXTRA. Tratamento com FP20/20 O.C.	Adultos, mesmo sem sintomatologia podem ser portadores/transmissores. Desinfecção de material de utensílios com VIRUDINE ou VIRKON S
	Embríões não chegam a nascer (na forma crónica). Os adultos não apresentam sintomatologia própria. Na forma aguda: grande mortalidade nas crias, que apresentam intestinos muito congestionados, fígado escuro. Na necrópsia a visícula biliar aparece hipertrofiada. Diarreia branca, cloaca obstruída por fezes.	Salmonelose	"Salmonela typhi" (paratifose) transmitida por pardais, ratos, etc.	Isolar e de preferência sacrificar, pois os pais serão quase sempre portadores da doença. Profilaxia: FP 20/20 O.C. ou ENTEROPLUS, nas crias e reprodutores. Muito difícil nas crias. PROTEXIN a seguir	Contagiosas de pais para filhos através dos ovos. Crias morrem entre o 8º e 15º dias. Desinfecções das instalações e do material com VIRUDINE ou VIRKON S.
DO APARELHO RESPIRATÓRIO	Destilação lacrimal sem dispneia nem ruídos. Fluxo normal	Catarro	Mudança brusca de temperatura. Correntes de ar	Isolar, colocar em local aquecido. Administrar PNEUMO-RINO seguido de PROTEXIN	Contagiosa para outras aves. Prevenção com POLI-CRD.
	Como no caso anterior, mas com fluxo nasal purulento e odor fétido	Coriza	"Bactéria Haemófilus"	Isolar, colocar em local aquecido. Administrar PNEUMO-RINO seguido de PROTEXIN	Contagiosa para outras aves.
	Destilação nasal sem dispneia nem ruídos. Deformidade nas membranas nasais, com crostas. Falta de penas à volta dos olhos e comissuras no bico.	Micoses	De origem fúngica ou por ácaros	FUNGISTOP na água da bebida e limpeza posterior das deformidades, ZOOSPRAY	Ornecer Vit AE 150/150 AMINOVIT L VITA B COMPLEXO. Desinfectar com VIRUDINE ou VIRKON S
	Dispneia (dificuldade em respirar) Mancha escura no fígado	"C.R.D." (Doença Respiratória Crónica)	Micoplasma (contagiosa para outras aves)	Isolar. PNEUMO-RINO ou POLI-CRD, seguido de PROTEXIN.	Desinfecções com VIRUDINE ou VIRKON S.
	Dispneia e ruído respiratório. Tossícuca, como se tentasse expulsar algo.	"Asma Acariástica"	Ácaros (Stenostoma tracheacolum) que se alojam na traqueia.	Higiene. ACRIASMA ou ZOOSPRAY	Limpeza das sementes
PARASITISMO	Cavidade bucal avermelhada. Inchaço na garganta. Espessamento caseoso na faringe e por detrás da língua. Diarreia crónica mal cheirosa e musóide.	"Trichomonas", "Giardiose" em periquitos e caturras	Transmissão de pais para filhos, ou pelas fezes	Desparasitar os pais com INTERVERMES O.C. ou VERMIZOON, seguido de ZOODIMETOXIN (6 a 18 dias). Muita atenção à dosagem	Vitamina A. Não é possível a cura das crias. Utilizar sempre águas limpas e desinfectar com VIRUDINE ou VIRKON S.
	Emagrecimento. A ave come. Specro triste. Fezes negras. Ventre inchado.	Parasitas internos (vermes)	"Nemátodos, ténias, heterakis", etc., transmitidos (os ovos) pelo solo de terra ou pela sementes	Desparasitação trimestral com VERMIZOON, INTREVERMES O.C. ou INTERVERMES Plus	Limpeza do solo e das sementes
	Emagrecimento. Abandono do ninho	Parasitas Externos	Ácaros e/ou piolhos	Pulverizar as aves e as instalações com ZOOSPRAY.	O piolho vermelho (sugador de sangue) só ataca durante a noite.

(*) Sendo esta uma informação da Avizoon, obviamente que as terapêuticas apresentadas são produtos desta marca. Aconselhamos por isso a ler esta informação com algum sentido crítico e dando especial relevo à sintomatologia e aos respectivos diagnósticos e causas prováveis.

A leitura desta informação não dispensa o recurso a apoio veterinário sempre que necessário.